


31 Calendrier fourrager



Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1 ^{er} janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} janvier	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	93	281	206
Chateau-Chinon	598	136	228	164
Clamecy	215	65	303	213
Dun les Places	598	148	207	150
Lormes	485	100	274	193
Luzy	300	100	270	198
Montigny en Morvan	285	100	269	190
Nevers	175	68	303	209
Prémery	260	97	288	202

Situation météo au 6 mars 2022 d'après données MétéoFrance

La pousse de l'herbe tarde à démarrer à cause du sec et des gelées de ces derniers jours. Une quarantaine de degrés supplémentaires ont été cumulés la semaine dernière. Les 200°C cumulés depuis le 1^{er} janvier sont maintenant atteints sur l'ensemble du département. De la pluie est prévue pour cette fin de semaine et les prévisions pour la semaine prochaine indiquent des températures printanières. La végétation devrait se réveiller. Profitez de cette fin de semaine pour réaliser vos apports d'azote avant la pluie.

Mise à l'herbe des bovins – se tenir prêt

Si la mise à l'herbe des ovins a pu commencer, celle des bovins ne devrait pas intervenir avant une quinzaine de jours dans les zones les plus précoces du département. Il est cependant nécessaire d'anticiper pour pouvoir lâcher à temps et ainsi profiter pleinement de l'herbe du printemps. Clôtures, diagnostics de gestation, interventions vétérinaires (vaccination, déparasitage,...), constitution des lots... doivent être faits en amont. Une mise à l'herbe précoce (dès 300°C cumulés) limite fortement le risque de se faire dépasser par l'herbe au mois de mai.




Suivi hebdomadaire de la pousse d'herbe

Comme chaque année, afin que les préconisations apportées par ce bulletin collent au plus près des réalités de terrain, les conseillers de l'équipe élevage ont en charge le suivi de prairies réparties sur l'ensemble du département.

Au total, 12 prairies permanentes sont mesurées chaque semaine, à l'aide d'un herbomètre. Ces mesures permettent de calculer la pousse hebdomadaire.

En parallèle de ces mesures, d'autres prairies sont suivies : prairie temporaires de différentes compositions (ray-grass d'Italie, luzerne, mélange multi-espèce,...) et méteils fourragers.

- Les mesures d'herbe hebdomadaires permettent d'apporter des préconisations sur la gestion du pâturage au cours du printemps.
- Le suivi des prairies fauchées permet de suivre l'évolution des stades de la végétation et de dispenser des préconisations sur la récolte.



Répartition des 12 prairies mesurées chaque semaine