


POINT FOURRAGES

31 Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

Soutenu par
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE

Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} janvier	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	122	356	210
Chateau-Chinon	598	217	290	162
Clamecy	215	126	371	218
Dun les Places	598	242	279	155
Lormes	485	171	318	178
Luzy	300	165	348	207
Marzy	175	111	376	221
Montigny en Morvan	285	161	353	209
Prémery	260	175	363	211

Situation au 27 février 2024 (d'après données Météo-France)

En fonction de l'altitude, 35 à 50°C ont été cumulés ces sept derniers jours. Plus de 200°C ont été cumulés en quatre semaines seulement dans les secteurs les plus précoces. A ce rythme-là, il devrait être possible de démarrer la mise à l'herbe dès la mi-mars, si la portance le permet. Les précipitations persistent et tous les apports d'engrais sur les parcelles prévues en fauche précoce n'ont pas pu être effectués. Un décalage de l'apport d'azote (500°Cj à la place des 200°Cj cumulés depuis le 1er Janvier) pénalisera le rendement fourrager et augmentera la MAT du fourrage par concentration.



Pourquoi pratiquer le pâturage tournant ?

L'objectif du pâturage tournant est d'offrir en permanence aux animaux une herbe jeune, au stade feuillu, donc d'excellente valeur alimentaire. Il permet de ne pas se faire dépasser par la pousse de printemps qui engendre un gaspillage d'herbe important en pâturage continu. Cette méthode de pâturage présente ainsi les avantages suivants :

- Pas d'herbe gaspillée,
- Amélioration de l'autonomie fourragère (chargement plus élevé au pâturage donc plus de surfaces disponibles pour la fauche),
- Diminution de la consommation de concentrés tout en maintenant les croissances des jeunes animaux.

Une mise à l'herbe précoce, clé de la réussite

Les clôtures et le découpage du parcellaire doivent être effectués en hiver afin de pouvoir lâcher les animaux dès que les conditions s'y prêtent. Une mise à l'herbe précoce (dès 350°C cumulés depuis le 1^{er} février) est indispensable pour la réussite du pâturage tournant.

Pour réussir son découpage du parcellaire, il faut d'abord réfléchir aux nombres de lots d'animaux qui doivent être créés pour le pâturage et ensuite attribuer à chacun d'entre eux une surface à pâturer, appelée surface de base (40 à 50 ares par UGB, en fonction du potentiel de la prairie). Celle-ci doit ensuite être découpée en paddocks, de tailles homogènes dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes existantes (points d'eau, haies, etc). Un minimum de cinq paddocks dont un fauchable est indispensable pour pratiquer un pâturage tournant efficace.

Exemple : 1 lot de 20 vaches suitées et un taureau dans une prairie avec un potentiel plutôt faible devra disposer de 10,5 ha (21 UGB*50 ares/UGB). Ces 10,5 ha seront à découper en 5 paddocks (minimum !) de 2,1 ha.



Envie de mettre en place le pâturage tournant sur votre exploitation ?

Contactez les conseillers de la Chambre d'Agriculture :

Nord : Charles Duvignaud – 0633270260 (Corbigny)

Sud : Christophe Dagouneau – 0633639132 (Moulins Engilbert)