




Point Fourrages

Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

02/05/2019


N°12

Calendrier fourrager



Agro – Météo

La pluviométrie de la semaine dernière a été favorable à la pousse. La croissance de l'herbe se poursuit sur l'ensemble du département mais de manière moins soutenue que la semaine précédente (environ 80 kg de MS/ha/jour). Avec 80°C supplémentaires cumulés la semaine dernière, les 700°C cumulés depuis début février sont maintenant atteints sur l'ensemble du département. Les prairies permanentes non déprimées commencent à épier dans les secteurs les plus précoces. Les prévisions météo ne laissent guère de créneau possible pour la fauche précoce dans les jours à venir. Celles-ci seront à prévoir dès qu'un créneau de beau temps (3 jours minimum) est annoncé.



Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio semaine passée (mm)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	34,2	237,2	727
Château-Chinon	598	47	359,5	848
Clamecy	215	27,4	156,2	744
Dun les Places	598	30,2	318	678
Lormes	485	40,8	327,6	767
Nevers	175	38,1	175,6	734
Prémery	260	41,2	234,4	730

Degrés cumulés depuis le 1^{er} février 2019





Fourrages

Qu'implanter après une fauche précoce ?

Les parcelles de MCPI récoltées courant mai vont laisser de la surface disponible pour implanter une nouvelle culture fourragère pour faire du stock. Un semis de fin mai/début juin est plus sécurisant pour les levées qu'un semis de fin juillet/début août car le risque de sécheresse est plus faible.

Il existe différentes possibilités :

- Sorgho fourrager : les sorghos fourragers multicoupes ont un cycle d'exploitation rapide (40 à 45 jours). Ils peuvent être valorisés aussi bien en foin, qu'en enrubannage, ensilage ou pâturage. Ils peuvent être associés à un trèfle d'Alexandrie ou un trèfle de Perse pour améliorer la valeur azotée. Les sorghos fourragers monocoupe sont à utiliser dans un but de constituer du stock sous forme d'ensilage en fin d'été/début d'automne.
- Millet perlé : seul ou en association avec un trèfle annuel (trèfle d'Alexandrie idéalement). C'est un fourrage bien adapté à l'ensilage ou à l'enrubannage et qui présente également une bonne appétence au pâturage.
- Moha : seul ou en association avec un trèfle d'Alexandrie. Un semis précoce va permettre une première exploitation fin juillet/début août (sous forme de foin). Il est aussi possible de le faire pâturer en cas de manque d'herbe mais l'appétence est moyenne.



Bovins viande

Choisir son aliment broutard

Lors du choix d'un aliment broutard, le prix ne doit pas être le seul critère pris en compte. Plus le niveau en énergie (UFV) est élevée, plus le GMQ est important et moins les animaux en consommeront. A l'inverse, en aliment plus pauvre en UFV sera consommé en plus grande quantité et l'indice de consommation sera moins bon. Pour des mâles avec un objectif de vente précoce disposant d'un aliment à disposition à volonté, il faut privilégier un aliment supérieur à 0,95 UF avec un taux d'amidon compris entre 20 et 25 % : en dessous on stimule l'ingestion, au-delà il y a des risques de troubles digestifs.

Un pâturage tournant bien géré permet à des veaux mâles d'avoir des performances de croissances identiques avec une moindre consommation d'aliment.



Des conseillers élevage à votre service

Tél : 03 86 93 40 60

Mail :

elevage@nievre.chambagri.fr

