

POINT FOURRAGES

Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

26/08/2020

N°32

Ovins

Attention au risque d'haemonchose

Le retour de la pluie dans certaines zones rend les conditions favorables au développement des strongles, dont *Haemonchus contortus*.

Les larves se trouvant au ras du sol, le surpâturage augmente le risque d'infestation.

Le cycle de l'haemonchose est très rapide et peut occasionner des mortalités subites des brebis et agneaux en parfaite santé au pré.

Haemonchus se nourrissant de sang, les signes observés sont ceux de l'anémie, décelable en regardant les muqueuses (œil ou gencive) qui sont alors roses pâles à blanc-porcelaine.

Le signe de la bouteille (œdème sous le cou) est très fréquent mais la grande douve peut en être aussi la cause.

La diarrhée et l'état de maigreur sont rarement observés car la maladie évolue trop vite.

Même si des traitements curatifs d'urgence peuvent être mis en place en cas d'haemonchose déclarée afin de limiter la mortalité, c'est une pathologie qu'il faut prévenir en utilisant des strongycides à action rémanente.

Pour plus d'informations, contactez votre vétérinaire.

Préparer la mise en lutte des brebis

En période de sécheresse, réaliser un flushing avec un foin moyen et un apport d'énergie sous forme de céréales dont la quantité distribuée peut atteindre 500 à 600 g par brebis et par jour pour garantir fertilité et prolificité.

Un apport de minéraux et vitamines permettra d'améliorer les performances de reproduction.

Vos agnelles de renouvellement doivent être triées et complémentées en l'absence d'herbe.

Celles nées en février – mars doivent peser au moins 36 kg au 1^{er} septembre pour avoir une chance d'atteindre les 2/3 du poids adulte lors de la lutte en fin d'année.