

## Se tenir prêt à reconstituer ses stocks au printemps prochain

### Des semis de fin d'été 2019 aussi compliqués que l'année passée

La faible pluviométrie depuis mi-août n'a pas permis de semer les fourragères dans de bonnes conditions. **Les semis de ray-grass (italien, hybride ou anglais) pourront s'effectuer jusqu'à mi-octobre.** Accompagné de trèfle incarnat, le RGI sera à semer avant le début du mois d'octobre. **Pour les espèces d'installation plus lente (fétuques, dactyles, trèfles blancs...), il est désormais plus prudent de les semer sous couvert.**

### Semis de prairie longue durée sous couvert

#### Exemple de couverts

#### Céréales pures :

- 70 kg de triticales + 30 kg d'avoine d'hiver
- 120 kg de triticales

#### Méteils :

- 50 kg de triticales + 25 kg d'avoine d'hiver + 30 kg de pois fourrager ARKTA + 15 kg de vesce velue
- 90 kg de triticales + 30 kg de pois fourrager ARKTA + 15 kg de vesce velue

Les mélanges avec avoine auront une valeur alimentaire un peu plus élevée et seront plus souples d'exploitation puisque l'avoine est plus tardive que le triticales.

D'autres mélanges sont possibles, afin de permettre la bonne expression des deux cultures visez un **semis d'environ 300 grains/m<sup>2</sup>.**

#### Itinéraire technique

**Semis :** entre le 1<sup>er</sup> et le 15 octobre.

2 stratégies :

- Semer en premier la céréale ou le méteil à 3 cm de profondeur puis la prairie en croisé à 1 cm de profondeur et rouler

- Semer avec un semoir à double caissons et rouler.

#### Fertilisation :

- Incorporez 15 t/ha de fumier en surface juste avant l'implantation à l'aide d'un cover-crop.
- 1<sup>er</sup> apport précoce de 30 unités d'azote aux 200 degrés (vers la mi-février) pour une exploitation précoce.

#### Récolte :

**Très précoce** = Gonflement de la céréale → animaux à fort besoin.

Valeurs attendues d'un méteil : 0,9 UFL et 160 MAT.

**Précoce** = Début de floraison du pois ou début d'épiaison de la céréales → Animaux à besoin plus modéré.

Valeurs attendues d'un méteil : 0,8 UFL et 120 MAT.

Dans les deux cas, **à la mi-mai le méteil sera récolté et la prairie pourra alors pleinement s'exprimer.**

#### Luzernes

La dernière exploitation doit avoir lieu **3 semaines avant les premières gelées**, afin de ne pas pénaliser les repousses du printemps prochain.

### Apport de compost ou fumier vieilli sur les prairies

Après la sortie des animaux des prairies, ce sera la **période optimale d'épandage de compost ou de fumier vieilli.** Ces effluents se décomposeront pendant l'hiver et donc les **éléments fertilisants P et K seront disponibles pour le printemps prochain.** Enfin l'apport d'automne **stimule la vie biologique** du sol durant l'hiver.

#### Alysé

Rédaction : Ophélie COLLARD – Tel : 06.06.50.97.31

Info Fourrages est disponible sur [www.alyse-elevage.fr](http://www.alyse-elevage.fr),  
[www.aube.chambagri.fr](http://www.aube.chambagri.fr), [www.loiret.chambagri.fr](http://www.loiret.chambagri.fr),  
[www.yonne.chambagri.fr](http://www.yonne.chambagri.fr)